

rekrutierende Studien - Brustzentrum Essen I am WTZ Stand 04/2024

| Therapie | Studie | Indikation |
|---|--------------------------------|--|
| Neoadjuvant | ADAPT HER2 IV | neoadjuvante, an dynamischen Markern angepasste, personalisierte Therapie zum Vergleich von TDX-d vs. Pacli +/- Carbo plus dualer Blockade bei HER2 positivem frühen Brustkrebs |
| Neoadjuvant/ adjuvant/ palliativ | PREPARE | Prävention von Paclitaxel-induzierten neurologischen Nebenwirkungen mit Lithiumcarbonat |
| Adjuvant | ADAPTlate HER2-/HR+ | Eine randomisierte, kontrollierte, offene, adjuvante, an dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapiestudie der Phase-III zum Vergleich der Therapie von Abemaciclib plus endokriner Standardtherapie gegenüber alleiniger adjuvanter endokriner Standardtherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem Brustkrebs im Frühstadium mit klinisch oder genomisch hohem Risiko für Spätrezidiv. |
| Sonstige Register | BCP | Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft. Auch für nicht-Schwangere <40. |
| NIS | CAPTOR-BC | einarmige, offene Phase IV Studie zur Erforschung und Validierung von molekularen und nicht-molekularen Biomarkern zur Vorhersage des Therapieansprechen bei SoC Therapie mit Ribociclib + endokr. Therapie |
| Sonstige prospektiv operativ | EUBREAST-01 | Verzicht auf die Entfernung des Sentinel-Lymphknotens bei Patienten mit triple-negativen und HER2-positiven Mammakarzinom mit radiologischer und pathologischer Komplettremission in der Brust nach neoadjuvanter Systemtherapie: eine einarmige, prospektiv-chirurgische Studie. |
| Sonstige | Libre | Lebensstilintervention bei Frauen mit erblichem Brust- und Eierstockkrebs |
| Sonstige Register | Register Mann-Ca | Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms des Mannes. |