

Offene Studien im Brust- und Genitalkrebszentrum des Marienhospitals



Stand 05.09.2022

Gültigkeit: MH
Marienhospital

ABT
Abteilung

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Brust- und Genitalkrebszentrum

Primäres Mammakarzinom

Studie	Indikation	Therapie
ADAPTcycle (neoadjuvant & adjuvant)	Mammakarzinom mittleres Risiko Hormonrezeptor positiv Her2 -	Endokrine Therapie+ Ribociclib oder Chemotherapie
Trio048 (neoadjuvant)	Mamma Ca ER+ Her2 -, postmenopausal In Vorbereitung	AvR.471 vs. Anastozol für 6 Zyklen
SASCIA (Postneoadjuvant)	Behandlung von Sacituzumab Govitecan, einem Antikörper- Medikamenten-Konjugat bei primärem HER2-negativem Brustkrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko nach einer Standard Neoadjuvante Chemotherapie	Sacituzumab Govitecan versus SoC
NeoOn (Neoadjuvant)	Behandlung mit Ontruzant mit Her2 pos.frühem Mamma Ca	Ontruzant (SB3) + SoC
Ember-4 (adjuvant)	nach vorheriger mind. 2 -5 Jähriger Endokriner Therapie , ER+ Her2- in Vorbereitung	Ilunestrant vs SoC
Astefania (adjuvant)	Her2+, high Risk (cT4/anyN/M0, any cT/cN2-3/M0 o. cT1c-3/N0- 1/M0)	Atezolizumab / Placebo und Trasuzumab emtansine
Trio045 -> LidERA (adjuvant)	ER+, Her2-, Stadium I-III , aktuell nur N1	Giredestrant vs. SoC
Pro2	Evaluation der digitalen Gesundheitsanwendung bei Her2 + Mamma CA während der Chemotherapie In Vorbereitung	SoC
Axsana	Mammakarzinom, Bewertung von SLNB, Axilla, TAD nach neoadjuvanter Chemotherapie	keine
Eubreast-01	Verzicht auf SLNB bei triple- negativen und HER2-positiven Mammakarzinom-Patientinnen mit radiologischer und pathologischer Komplettremission nach neoadjuvanter Chemotherapie	keine

Metastasiertes Mammakarzinom

Studie	Indikation	Therapie
Detect V	Hormonrezeptor positiv und HER-2neu positiv	Chemotherapie / Ribbociclib versus endokrine Therapie mit Trastuzumab und Pertuzumab
SGNLVA-002	Mammakarzinom, lokalfortgeschritten/ metastasiert tripel negativ firstline	SLN-LIV1A + Pembrolizumab
Compredo	Mammakarzinom Her2 neg mit Genmutation In Vorbereitung	Pembrolizumab und Olaparib
PerForm	MBC HR pos, Her2 neg.	Kombination von Palbociclib + AI oder Fulvestrant
SERENA 4	MBC ER pos Her2 neg , mind. 24 monatige Vortherapie mit AI o. Tamoxifen	AZD9833 + Palbociclib+ Placebo versus Anastrozol + Palbociclib+ Placebo
AIRE	Met. Mamma CA, Untersuchung der Immunantwort nach Behandlung mit Chemotherapie	Eribulin
Destiny Breast -07	Met. Mamma CA, Her2+ firstline	Trastuzumab Deruxtecán in Kombination mit ggfs. Chemotherapie
Captor-B	Met. Mamma CA Her2 - molekulare Analyse firstline	Ribociclib + SoC
Register Mamma Ca beim Mann	MaCa	SoC

Ovarialkarzinom

Studie	Indikation	Therapie
NIs Scout-1	Ovarail Ca+ geplante BRCA Testung	Platinbasierte Firstline Chemotherapie
Nis Smaragd	fortg. Ovarial- Eileiter u. primäres peritoneum Ca	SoC
AGO OVAR 28	Ovarial Ca (in Vorbereitung)	Niraparib vs. Niraparib + Bevacizumab